

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤

ウチダの 五苓散

ゴレイサン

ウチダの五苓散は漢方処方にしたがって、生薬と生薬末を配合して製した散剤で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起りやすくなる)

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
* (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- * (2) 1ヵ月位(急性胃腸炎に服用する場合には5~6回、水瀉性下痢、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合

成分・分量

本品 1000g 中	
タクシャ末	310g
チョレイ	190g
ブクリョウ末	190g
ソウジュツ末	190g
ケイヒ末	120g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬

フリーダイヤル 0120-384638

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

胃部に水分停滞感あり、口渇し、尿量減少するもの、また頭痛、発熱、眩暈^{注1)}、悪心、嘔吐、下痢、浮腫などを伴うもの。急性胃腸炎、胃拡張、糖尿病、癲癇^{注2)}、船暈病^{注3)}、急性慢性腎炎、ネフローゼ、急性膀胱炎、小児の下痢、吐乳、暑気当り、二日酔。

注1) 「眩暈」とはめまいを指します。

注2) 「癲癇」とは発作的に痙攣・意識喪失などの症状を現す疾患を指します。

注3) 「船暈病」とは船酔病を指します。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前1時間または食間空腹時に水または温湯で服用する。

年齢	1回量
大人(15才以上)	1.0~2.0g
15才未満5才迄	0.5~1.0g
5才未満	0.3~0.6g

用法・用量に関連する注意

- 添付のサジはすり切りで、大サジ1ばいが約1g、小サジ1ばいが約0.1gです。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

** (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8